



QUEEN CITY

GASTROENTEROLOGY
& HEPATOLOGY

320 Lillington Ave, Suite 101

Charlotte, NC 28204-3189

2 días de preparación para colonoscopia

1. Si usted está tomando **PLAVIX** detenerlo durante 7 días antes del procedimiento.
2. Deje **MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR** como la aspirina, Motrin, naproxeno, Excedrin, polvo de Goody, Salsalato, Ibuprofen, Advil, Aleve o durante 5 días antes del procedimiento.
3. No comer frutas con semillas y **VEGETALES** durante 3 días antes del procedimiento.
4. Tome **SOLO LIQUIDOS CLAROS** durante 2 días antes del procedimiento - por favor no coma verde, azul, rojo o gelatina. * Los líquidos claros se compone de zumo de manzana, jugo de arándano, jugo de uva, el caldo, café, refresco de jengibre, azúcar, Gatorade, té, gaseosas.
5. Beba una botella de **CITRATO DE MAGNESIO** a las 3pm en dos días antes del procedimiento, recuerde que usted sólo puede tomar líquidos claros en este día o gelatina (excepto para el rojo, azul o verde).
6. Mezclar Golyte según las indicaciones y refrigerarlo durante la noche.
7. El día antes del procedimiento tomar **DULCOLAX** a las 8:00 de la mañana, recuerde que usted sólo puede tomar líquidos claros en este día.
8. Empiece a tomar **GOLYTE** como se indica a la 1:00 pm, beber un vaso cada 10 minutos hasta que todo se acabe, si siente **nauseas, dese un descanso de 20 a 30 minutos.**
9. Beba **MUCHO LIQUIDO** para que no se deshidrate.
10. No coma ni beba nada después de la medianoche el día antes del procedimiento.
11. No tome su presión arterial o medicamentos para la diabetes en el día del procedimiento.

Si tiene alguna pregunta, porfavor llamenos a nuestra oficina al 704-362-4403