



320 Lillington Ave, Suite 101
Charlotte, NC, 28204

Instrucciones para la prueba de la mala absorcion de fructose

Instrucciones para el paciente:

- No puede comer ningun tipo de comida que sea lento en digerir como frijoles (habichuelas), bran o algun tipo de cereal alto en fibra el dia antes de su procedimiento.
- Tiene que estar en ayunas 12 horas, sin comida nada mas puede beber agua antes antes de su procedimiento. Por lo tanto, NO COMIDAS/LIQUIDOS despues de _____.
- No puede fumar, dormir o hacer ejercicio vigoroso por lo menos 2 horas antes, o al momento de su procedimiento.
- Informe a la enfermera si esta recibiendo alguna terapia con antibioticos y/o si ha tenido diarrea recientemente, ya que eso puede afectar el resultado.
- DIA DEL PROCEDIMIENTO: Beba 12 onzas de Coca-cola o Pepsi (regular, no puede ser de dieta) 12 onzas = 1 lata regular 3 horas antes de su procedimiento.
Beba 12 onzas de Coca-Cola regular o Pepsi a las _____.

- Tiene que estar en Queen City Gastroenterology & Hepatology a las _____.

No dude en llamarnos al 704-362-4403 si tiene alguna duda o pregunta.

Gracias